



## Vyhodnocení endodontické léčby

[www.endodont.cz](http://www.endodont.cz)

Ošetření kořenových kanálků by mělo být vyhodnocováno nejdříve po 6 měsících a následně podle potřeby.

### ÚSPĚŠNÉ OŠETŘENÍ

- bez bolesti a otoku
- bez píštěle
- bez ztráty funkce
- radiologický důkaz normálního periodontálního prostoru kolem kořene (neporušená *lamina corticalis*)

### NEJISTÝ VÝSLEDEK

- rentgenové snímky odhalí, že léze zůstala stejné velikosti nebo se pouze mírně zmenšila
- dále sledovat dokud nebude periodontální prostor uzdraven, nebo po dobu minimálně 4 let
- pokud léze přetrvá po 4 letech, je výsledek považován za neúspěch

### NEPŘÍZIVÝ VÝSLEDEK

- jsou přítomny symptomy infekce nebo bolest
- radiologická léze se objevila po léčbě nebo již existující léze se zvětšila
- léze zůstala stejné velikosti, nebo se pouze mírně zmenšila během čtyřletého posuzování
- jsou přítomny známky pokračující resorpce

Výjimka: rozsáhlá radiologická léze se může vyhojit, ale zanechá viditelné, nepravidelně mineralizované oblasti. Toto může být následkem vytvoření živé tkáně, nikoli projevem přetrvávající apikální periodontitidy. Zub by měl být i nadále sledován.